

# ワクチンと 接種方法が 変わりました

今までの「生ポリオワクチン」の定期接種（口から飲む）は中止となり、単独の「不活化ポリオワクチン」の定期接種（皮下に注射）となります。



不活化ポリオ予防接種実施医療機関一覧		
医療機関名	所在地	電話番号
長谷川医院	東町216	22-0070
石原医院	東町157-2	22-0550
渡辺医院	花崎町533	22-0257
京増内科クリニック	花崎町842-3	22-1717
大田クリニック	ウイング土屋141	23-2100
ひらの内科	ウイング土屋170	23-8070
いとう こどもクリニック	美郷台1丁目15-8	20-3325
むらまつクリニック	飯田町124-3	20-5551
石川医院	並木町143-97	20-1700
いしがみ医院	公津の杜2丁目 17-7	26-2888
わたなべクリニック	公津の杜3丁目 3-8	36-7878
渡辺小児科医院	はなのき台 1丁目22番地14	28-1212
麻野クリニック	三里塚御料 1-1376	35-4588
鳥居内科医院	吾妻3丁目49-1	27-3456
小児科川辺医院	加良部1丁目5-2	27-5377
つかだ ファミリークリニック	加良部5丁目7-2	26-4750
小田内科医院	玉造4丁目42-3	28-2256
中島医院	中台6丁目2-1	27-3454
矢野医院	猿山1131	96-0071
岡崎医院	吉岡15-2	73-5225
なのはなクリニック	吉岡1342-7	49-0533

\*成田市外で接種を希望する人は健康増進課へ連絡してください。

飲む生ワクチンでしたが、9月から  
ポリオワクチンは今まで口から

## 飲むワクチンから 皮下注射に変わります

日本で自然感染することはほとんどなくなりましたが、海外ではまだ流行している地域があります。

ポリオにかかると、重症の場合は発熱程度で済みますが、重症になると手足にまひが残ることがあります。

ポリオ（急性灰白髄炎＝小児まひ）はポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染する病気です。成人が感染することもありますが、乳幼児がかかることが多い病気です。

飲み生ワクチンでしたが、9月から追加接種

生ワクチンを1回接種した人：  
不活化ワクチンを3回接種（1回接種後20日以上の間隔で2回目、その後6カ月以上経ってから追加接種）

追加接種：初回3回目の接種後6カ月以上経ってから1回接種  
生ワクチンの接種が済んでいる人  
生ワクチンを2回接種した人：  
不活化ワクチンでの接種は必要ありません

接種回数：4回  
初回接種：20日以上の間隔で3回接種  
追加接種：初回3回目の接種後6カ月以上経ってから1回接種

接種回数：4回  
初回接種：20日以上の間隔で3回接種

皮下に注射する単独不活化ワクチンとなりました。  
接種対象年齢：生後3カ月～90カ月（7歳6カ月）

※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

転入などで予防接種の手続きが済んでいない人には、はがきでお知らせします。

接種方法は、市内の医療機関での個別接種となります。接種時の料金支払いはありません。対象者へは問診票を個別に通知します（追加接種を除く枚数分送）。

接種方法は、市内の医療機関での個別接種となります。接種時の料金支払いはありません。

市内の医療機関で個別接種を

平成24年9月1日現在、4回目の追加接種は国内臨床試験中のため、定期予防接種の対象外となります（データが整い次第導入予定）。