

# Hib 感染症 (ヒブ)

Haemophilus influenzae type b

## ワクチンの種類

不活化ワクチン

## 対象年齢


生後 2 ヶ月から生後 60 ヶ月に至るまでの間にある方 (5 歳誕生日前日まで)

## 接種月齢と接種回数

※接種開始月齢により接種回数が異なります。

### 1. 接種開始が生後 2 ヶ月から生後 7 ヶ月に至るまで (生後 7 ヶ月前日まで) : 4 回


- ・ 初回接種: 1 歳までに 27 日 (医師が必要と認めた場合には 20 日) 以上 (標準的には 27 日~56 日) の間隔をおいて 3 回
- ・ 追加接種: 初回の 3 回目終了後 7 ヶ月以上 (標準的には 7 ヶ月~13 ヶ月未満) の間隔をおいて 1 回



※ 初回の 2 回目、3 回目の接種は、1 歳までに接種する。1 歳を超えた場合は 2 回目、3 回目は実施しない。  
追加接種は接種可能。初回接種が 3 回終了せずに 1 歳を超えた場合の追加接種は、初回の最後の接種から 27 日以上の間隔をおいて 1 回接種する。

### 2. 接種開始が生後 7 ヶ月から 12 ヶ月に至るまで (1 歳誕生日前日まで) : 3 回

- ・ 初回接種: 1 歳までに 27 日 (医師が必要と認めた場合には 20 日) 以上 (標準的には 27 日~56 日) の間隔をおいて 2 回
- ・ 追加接種: 初回の 2 回目終了後 7 ヶ月以上 (標準的には 7 ヶ月~13 ヶ月未満) の間隔をおいて 1 回



※ 初回の 2 回目の接種は、1 歳までに接種する。1 歳を超えた場合は 2 回目は実施しない。  
追加接種は可能。初回接種が 2 回終了せずに 1 歳を超えた場合の追加接種は、初回 1 回目の接種から 27 日以上の間隔をおいて 1 回接種する。

### 3. 接種開始が生後 12 ヶ月から生後 60 ヶ月に至るまで (5 歳誕生日前日まで) : 1 回